

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:-

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)

زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی:- دقیقه

رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی (ستی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمعی: ۱۲۱۷۰۶۴)

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی<sup>(ع)</sup>: شرافت به خود و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. راو، سه ملاک برای تفکیک سوء استفاده از مواد از استفاده مرضی مواد را معرفی کرده است. کدام یک از گزینه های زیر این عوامل را معرفی کرده است؟

الف. شدت مصرف، استفاده بیمار گونه، اختلال در وظایف اجتماعی، مدت مصرف

ب. استفاده بیمار گونه، مدت مصرف

ج. شدت مصرف، وجود علائم ترک، تولرانس یا تحمل

۲. کدام گزینه زیر قدیمی ترین سرزمهینی است که مصرف مواد مخدر در آن رواج داشته است؟

الف. ایران

ب. آمریکای جنوبی

ج. هندوستان

۳. کدام یک از دانشمندان ایرانی، مطالعاتی درباره تریاک داشته اند؟

الف. ذکریای رازی

ب. ابن سینا

ج. فارابی

۴. قانون تشديد مجازات مواد مخدر در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟

الف. ۱۳۶۱

ب. ۱۳۷۵

ج. ۱۳۵۹

۵. طبق طبقه بندی مواد پروفسور دونیکر کدام یک از مواد زیر حاصل تحقیقات آزمایشگاهی است؟

الف. مشروبات الکلی

ب. آمفاتامینها

ج. خواب آورها

۶. کدام یک از گزینه های زیر الکلیسم اپسیلون از دیدگاه جلینگ را بیان می کند؟

الف. هر گونه مصرف مشروبات الکلی که برای فرد یا اجتماع زیان آور باشد.

ب. عوارضی مانند اختلالات فیزیولوژیک، بیماری کبدی و عروقی ایجاد کند.

ج. در میگساری شدید در چند نوبت فرد بین چند روز تا چند هفته مشروب می خورد

د. شرب مداوم و سریع توام با ناتوانی از ننوشیدن حتی برای زمانی کوتاه

۷. تورم تعداد زیادی از سلولهای اعصاب محیطی، ناتوانی در به یاد آوردن وقایع اخیر و تکمیل نواقص خاطرات با داستانهای

تخیلی (افسانه پردازی) از نشانه های کدام یک از نشانه های روانی حاصل از استعمال دراز مدت الکل است؟

الف. نشانگان کورساکوف

ب. نشانگان ورنیکه

ج. حمله الکلی

د. زوال مزمن الکلی

۸. مصرف کدام دسته از مواد همراه با الکل بسیار خطرناک است و حتی می تواند منجر به مرگ مصرف کننده شود؟

الف. تریاک و مشتقات آن

ب. آمفاتامینها

ج. باربیتوراتها

د. ب و ج

۹. کدام یک از نشانه های ترک تریاک و مشتقات آن زودتر بروز می کنند؟

الف. درد عضلانی، تهوع و استفراغ

ب. تب، اسهال، بی قراری

د. بی قراری، تحریک پذیری و بی خوابی

ج. شوک و اغتشاش ذهنی

۱۰. کدام عبارت زیر در مورد آثار مرفین صحیح است؟

الف. موجب افزایش شدید تپش قلب و ایست ناگهانی قلبی می شود.

ب. موجب بیوست می شود و در گذشته برای درمان اسهال به کار می رفت.

ج. مانع بروز حالت تهوع شده و برای تسکین درد تجویز می گردد.

د. آثار آن بر اعضاء و عملکرد فیزیولوژیک بدن هنوز شناخته نشده است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:-

زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی:- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مجاز است.

استفاده از:

گذرنی سوال: یک (۱)

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)

رشته تحصیلی، گذرنی درس: روانشناسی (ستی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمعی: ۱۲۱۷۰۶۴)

علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

گذرنی سوال: یک (۱)

۱۱. ترک اعتیاد به هروئین در چه دوره سنی از همه مشکل تر است؟

الف. میانسالی ۴۰ سالگی به بعد

ب. پیری ۶۰ سالگی به بعد

ج. جوانی زیر ۳۰ سالگی

د. تفاوتی ندارد

۱۲. ناراحتیهای قلبی، اختلال دستگاه گوارش، لاغری مفرط، پیری زودرس و سوراخ شدن دیواره داخلی بینی از آثار سوء کدامیک از مواد زیر است؟

الف. تریاک و مشتقات آن

ب. توهمند

ج. کوکائین

د. آمفاتامین

۱۳. کانابیس نام دیگر کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف. حشیش

ب. مسکالین

ج. فن سیکلیدین

د. کافئین

۱۴. آمفاتامین ها جزء کدام دسته از مواد محسوب می شوند؟

الف. مواد مخدر

ب. مواد محرك

ج. توهمند

د. خواب آورها

۱۵. انجام عمل دوپینگ که بعضی ورزشکاران مرتكب آن می شوند مربوط به مصرف کدام یک از مواد زیر است؟

الف. الكل

ب. متادون

ج. مسکالین

د. آمفاتامینها

۱۶. گم گشتگی عاطفی، وحشت، اختلالات سایکوتیک، احساس بزرگ شدن جسم و کسب توانایی پرواز از علائم مسمومیت با کدام ماده زیر است؟

الف. تریاک و مشتقات آن

ب. ماری جوانا

ج. ال اس دی

د. مسکالین

۱۷. حشیش دارای کدام یک از آثار زیر است؟

الف. آثار کیف زا

ب. آثار تحریک کننده

ج. آثار توهمند

د. همه موارد

۱۸. کدام گزینه در مورد کافئین موثر است؟

الف. به دلیل کاهش آستانه تحریک، تحریک پذیری نورونها را افزایش می دهد.

ب. اثرات آرامبخش دارد و فرد را دچار خواب آلودگی و کسالت می کند.

ج. اثرات تشنج آفرینی آن از تئوفیلین بیشتر است و تحریکات مغزی خطرناکی ایجاد می کند.

د. دارای اثرات توهمند زایی و کیف آور است.

۱۹. مصرف سیگار در کدام گروه زیر بیشتر است؟

الف. بیماران افسرده

ب. بیماران دو قطبی

ج. بیماران اسکیزوفرن

د. افراد عادی

۲۰. مطالعات خانوادگی که درمورد الکلیسم در دنیا انجام شده است، کدام گزینه زیر را تایید می کند؟

الف. الکلیسم ارتباطی با مصرف این مواد در خانواده فرد ندارد.

ب. عیار الکلیسم در بستگان این بیماران به مراتب بیش از جمعیت کلی است.

ج. مطالعات مذکور هنوز پاسخ روشنی به دست نداده اند.

د. ۵۰٪ افراد معتاد به الكل دارای خانواده های الکلی بوده اند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:  
زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: - دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی، گذ درس: روانشناسی (ستی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمعی: ۱۲۱۷۰۶۴)  
علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰  
گذ سری سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از:

۲۱. دیدگاه روان کاوی الکلیسم را چگونه توجیه می کند؟  
 الف. مشروب خواری بازگشت به مرحله دهانی است.  
 ب. فرد الکلیک قادر بخش خودآگاه شخصیت است.  
 ج. مشروب خواری برای کاهش اضطراب و محرومیت است.  
 د. افراد برای آنکه از پس مسائل زندگی برآیند مشروب خواری می کنند
۲۲. کدام یک از گروههای شخصیتی زیر آمادگی بیشتری برای استفاده از مواد مخدر دارند؟  
 الف. افراد نوراتیک      ب. افراد هیستریک      ج. افراد خودشیفت      د. افراد ضد اجتماعی
۲۳. در دیدگاه کنبرگ کدام گروه شخصیتی، مناسب ترین گروه برای درمان تلقی می شوند؟  
 الف. شخصیت دپرسیومازو خیست      ب. شخصیت اسکیزوئید      ج. شخصیت خودشیفت
۲۴. از نظر جامعه شناسان معتقد به دیدگاه بر چسب اجتماعی اینکه مصرف کدام مواد ممنوع و انحرافی تلقی شود به کدام عامل زیر بستگی دارد؟  
 الف. موادی که با هنجارهای اجتماعی در تعارض باشند.      ب. موادی که صاحبان قدرت آنها را نپذیرند.  
 ج. موادی که مصرف آنها با ارزشهای اجتماعی در تضاد باشد.      د. موادی که عملکرد اجتماعی فرد را با اختلال شدید مواجه کند.
۲۵. از نظر نایت امکان اعتیاد به الكل در کدام گروه از کودکان زیر بیشتر است؟  
 الف. کودکانی که مورد بی مهری والدین قرار می گیرند.      ب. کودکانی که مورد سرزنش و تنبیه شدید قرار می گیرند.  
 ج. کودکانی که در خانواده های فاقد پدر و مادر زندگی می کنند.      د. کودکانی که مورد توجه افراطی والدین اند.
۲۶. روش معمول برای تشخیص اعتیاد، کدام روش زیر است؟  
 الف. آزمایش خوب      ب. آزمایش ادرار      ج. تزریق زیر جلدی ان - آلیل نورمرفین      د. الف و ب
۲۷. میل شدید به مصرف، دردهای عضلانی، اسهال، تب و بی خوابی از علائم ترک کدام ماده اعتیاد زاست؟  
 الف. مواد افیونی      ب. کوکائین      ج. آمفتابین      د. مواد توهمند زا
۲۸. در کدام یک از روشهای درمانی زیر عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و رشدی را در نظر بگیرند؟  
 الف. درمان با متادون      ب. درمان بیولوژیکی      ج. درمان غیر بیولوژیکی      د. درمان با آنتاگونیستهای مواد مخدر
۲۹. ساراسون، رویکرد درمانی زیست شناختی اعتیاد به الكل را چگونه تعبیر می کند؟  
 الف. می زدگی نوعی بیماری است و باید بر ضرورت اجتناب کامل از مصرف الكل تاکید کرد.  
 ب. اعتیاد به الكل حاصل نوعی شرطی شدن است و باید با روش شرطی سازی اجتنابی درمان شود.  
 ج. اعتیاد به الكل حاصل باورهای غلط و خطاهای شناختی معتاد است و باید آنها را اصلاح کرد.  
 د. هیچکدام
۳۰. اولین قدم در ترک اعتیاد را کدام گزینه زیر به شکل صحیح بیان کرده است؟  
 الف. قطع وابستگی روانی به مواد      ب. قطع وابستگی جسمی به مواد  
 ج. ایجاد شرایط محیطی مناسب برای فرد معتاد      د. ارائه آموزش‌های لازم برای ایجاد استقامت در صورت ترک اعتیاد