

مجاز است.

استفاده از:

۱. منشأ حفره عمومی کاذب از نظر جنینی چیست؟

- د. بلاستولا
ج. مژودرم

- الف. بلاستودرم
ب. بلاستوسل

۲. کدامیک از انواع پاهای کاذب آمیبها ظریف و منشعب است و در اثر پیوستن انشعابات آن ساختار شبکه یا تورینه مانندی ایجاد می‌کند.

- ب. پای کاذب رشته‌ای

- الف. پای کاذب لوبی

- د. پای کاذب ریشه‌ای

- ج. پای کاذب محو زدار

۳. آنتاموبا هیستولیقی کادقیا در کجا بدن کیست تشکیل می‌دهد؟

- ب. مخاط روید

- الف. لومن دستگاه کوارش

- د. زیر مخاط روید

- ج. کبد

۴. لیشمانیا دونوانتی در میزبان مهره‌دار به چه شکلی یافت می‌شود؟

- د. تریپوماستیگوت

- ب. اپی ماستیگوت

۵. کدام تک سلولی از دینوفلائر است، زرد دار و دارای سه خار و دو تازک است و به روش گیاهان تغذیه می‌کند؟

- ج. ئیارڈیامبیلا
د. نوکتیلوکا

- ب. سراتیوم

- الف. کودوسیگا

۶. بهترین راه تشخیص مalaria چیست؟

- الف. وجود مروزوئیت در خون

- د. تهیه لام خونی

- ج. وجود مروزوئیت در کبد

۷. در تولید مثل غیرجنSSI ورتیسل کدام گزینه نادرست است؟

- الف. درشت هسته به روش میتوز تقسیم می‌شود

- ب. تقسیم بدنه نامساوی است.

- ج. به روش تقسیم دوتایی عرضی است.

- د. تلو تروچ فاقد ساقه می‌باشد.

۸. زنبیل‌های لرzan در کدام اسفنج یافت می‌شود؟

- د. لوکوسولینا

- ب. آسکون

- الف. لوکون

۹. در کدامیک از انواع نماتوسمیستها نوک رشته یا لوله پیچ خورده آن باز است و به دنبال نفوذ به درون بافت‌های بدن شکار، یک مایع سمی به آن‌ها تزریق می‌نماید؟

- د. ولونت

- ب. پنترانت

- الف. گلوتینانت

- ج. گلوتینانت استرپتولاین

۱۰. شقایق دریایی (Metridium) به کدام رده تعلق دارد؟

- د. کیوبوزوا

- ب. هیدروزوا

- الف. سیفوزوا

- د. افیرا

- ج. استربیلا

- ب. پلانولا

- الف. هیدرولا

مجاز است.

استفاده از:

۱۲. در کدامیک از جانوران زیر معده به هشت کانال در زیر هشت ردیف صفحات شانه‌ای سطح بدن منشعب می‌گردد؟

ب. نمرت‌آ

الف. پلاتی هلمینت‌ها

د. کتونوفورا

ج. سلانتره‌ها

۱۳. کدام گزینه از جمله ویژگی‌های کرم‌های پهن می‌باشد؟

الف. تریپلوبلاستیک، آسلومات هستند

ب. حفره‌گواشی دارای دهان و مخرج می‌باشد.

ج. دارای تقارن همواطرفی و دارای سرمشخص هستند

د. کرم‌های پهن یک شاخه فرعی از یک چه دیپلوبلاستیک شعاعی هستند

۱۴. راسته گشاده‌هانان (macrostomida) از نظر حفره گوارشی در کدام گروه قرار می‌گیرند؟

الف. فاقد حفره گوارشی اند

ب. حفره گوارشی از یک اطاک ساده غیرمنشعب تشکیل شده

ج. حفره گوارشی منشعب از لوله‌های گوارشی چهار حفره‌ای

د. حفره گوارشی منشعب از لوله‌های گوارشی سه حفره‌ای

۱۵. در چرخه زندگی فاسیولا هپاتیکا چه فرمی از انگل بدن حلزاون را ترک می‌نماید؟

الف. میراسیدیوم ب. ردیا

ج. اسپیوروسیستا د. سرکاریا

۱۶. سیستم دفعی کرم‌های نواری (یوسستودا) کدام است؟

الف. واکوئل انقباضی

ج. لوله‌های مالپیگی

۱۷. کدام جانور در گروه سودوسلومات‌ها قرار دارد؟

الف. نرئیس ب. روتفیر

ج. مرجانها

د. پلاناریا

ب. نفریدیوم

د. پروتونفریدی

ج. نکاتور

ب. آسکاریس

ج. نکاتور

د. کرمک (انتروبیوس)

ب. آسکاریس

۱۸. کدامیک از کرم‌های نماتود زیر متعلق به روده آفاسمیدیا می‌باشد؟

الف. تریشینلا

ج. ووشریا بانکرفتی

د. آنتروبیوس ورمیکولاریس

الف. آنتروبیوس ورمیکولاریس

ج. ووشریا بانکرفتی

د. لارو کرم‌های حلقوی چه نام دارد؟

الف. ولیگر

ج. آکانتور

ب. تروکوفور

د. پی دی سید

ج. آکانتور

د. روده

ب. چینه دان

۱۹. کدام نماتود انگلی در سیستم لنفاوی انسان زندگی می‌کند؟

الف. آنتروبیوس ورمیکولاریس

ج. ووشریا بانکرفتی

د. آسکاریس لومبریکونیتس

الف. آسکاریس

۲۰. لارو کرم‌های حلقوی چه نام دارد؟

الف. ولیگر

ج. آکانتور

ب. تروکوفور

د. پی دی سید

ج. آکانتور

۲۱. یاخته‌های کلراگوژن مربوط به کدام بخش از دستگاه گوارش کرم خاکی می‌باشند؟

الف. مری

ج. سنگدان

ب. چینه دان

د. روده

ج. سنگدان

