

نام درس: روانشناسی اعتیاد - اعتیاد اجتماعی - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی (ست ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: ۳۰ دقیقه
تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۳۰
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

پیامبر اعظم (ص): روزه سیر آتش جهنم است.

۱. «رفتاری که بر اثر عادت بر فرد چنان مسلط می شود که کاملاً یا تا حدی رفتارهای سالم او را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را زیر سیطره خود درمی آورد» به تعریف کدام مورد زیر اشاره دارد؟
الف. مصرف افراطی ب. وابستگی ج. الکلیسم د. اعتیاد
۲. از نقطه نظر ج. راو ملاک مدت زمان مصرف برای سوءاستفاده از مواد چقدر است؟
الف. حداقل یک ماه ب. حداقل ۲ ماه ج. حداقل ۳ ماه د. حداقل ۶ ماه
۳. « ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در مقابل اثرهای ماده مخدر، طوری که فرد مجبور می شود برای ایجاد اثرهای قوی اولیه به تدریج ماده مخدر بیشتری مصرف کند» به کدام مورد زیر اشاره دارد؟
الف. وابستگی فیزیکی ب. تحمل ج. وابستگی روانی د. علائم قطع دارو
۴. تمایل به مصرف ماده ای که اثرات التذازی دارد یا تولید رضایت خاطر می کند، تعریف کدام مورد زیر است؟
الف. اعتیاد ب. وابستگی فیزیکی ج. وابستگی روانی د. وابستگی بیمارگونه
۵. کدام گروه زیر تریاک را دارویی آسمانی و شفابخش می دانستند و آنرا به عنوان بهترین درمان برای کلیه آلام جسمی و روحی مصرف می کردند؟
الف. هندیها ب. یونانیها ج. مصریها د. فرانسویها
۶. کدام داروی زیر به وسیله روان کاوان به عنوان درمان به کار گرفته شد و تصور می شد که می تواند عقده های سرکوفته بیمار را چاره کند؟
الف. LSD ب. آمفتامین ها ج. کوکائین د. باربیتورات
۷. در ایران از کدام دوره، تریاک کشی رایج شد و اغلب درباریان به این ماده معتاد شدند؟
الف. زندیان ب. صفویه ج. غزنویان د. قاجاریه
۸. بر اساس لایحه قانونی تشدید مجازات مواد مخدر (سال ۱۳۵۹) حمل یا نگهداری یا مخفی کردن چه مقدار تریاک منجر به مجازات اعدام می شد؟
الف. ۱ - ۰/۵ کیلوگرم ب. بیش از ۰/۵ کیلوگرم ج. بیش از یک کیلوگرم د. بیش از پنج کیلوگرم
۹. کدام مواد زیر تونوس روانی را پایین می آورند؟
الف. آمفتامینها ب. خواب آورها ج. بهت آورها د. توهم آورها
۱۰. کدام مواد مخدر زیر پسیکوز دارویی تولید می کنند؟
الف. خواب آورها ب. آرامش بخشها ج. هرویین د. ال.اس.دی
۱۱. کدام مواد مخدر زیر نشئه زاه هستند یعنی هیجانات و برخی دریافت های حسی را کاهش می دهند؟
الف. کوکائین ب. حشیش ج. قارچها د. الکل

نام درس: روانشناسی اعتیاد - اعتیاد اجتماعی - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی (سنتی ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: -- دقیقه
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: -- مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

۱۲. کدام مواد زیر فقط وابستگی جسمی یا فیزیولوژیایی ایجاد می کنند؟
الف. الکل ب. ماری جوانا ج. آمفتامین ها د. کوکائین
۱۳. با اینکه الکل کندکننده دستگاه عصبی است چرا ایجاد احساس برانگیختگی در فرد دارد؟
الف. به علت افزایش قدرت تشخیص و قضاوت
ب. به علت تأثیر روی مرکز تکلم
ج. به علت سهولت کردن برخی از قیدوبندهای عادی رفتار اجتماعی
د. به علت تأثیر روی مراکز کنترل کننده روان
۱۴. لرزش دستها، زبان، پلکها و نشانه های نظیر مهوع، استفراغ، کسالت یا ضعف، اضطراب، خلق افسرده، بی خوابی، تشنج یا کاهش فشارخون در حالت ایستاده جزء کدامیک از اثرات الکلیسم است؟
الف. تأثیر آنی الکل ب. حمله الکلی ج. سهولت الکل د. قطع ناگهانی الکل
۱۵. در کدام مورد زیر زوال دستگاه مرکزی اعصاب به ویژه مغز میانی مطرح است و شروع آن ناراحت کننده و اغلب پس از یک حمله دلیریوم آغاز می شود و ممکن است حال بیمار به تدریج وخیم شود تا حدی که به حالت بهت زدگی و اغما بیفتد؟
الف. توهمهای الکلی ب. نشانگان ورنیک ج. نشانگان کورساکف د. زوال مزمن الکلی
۱۶. کدامیک از موارد زیر در مجموعه گیرنده گابا اثر می گذارند؟
الف. بنزودیازپین ها ب. باریتوراتها ج. آمفتامین ها د. الکل
۱۷. استفاده زیاد از کدامیک از مواد زیر باعث وقفه تنفسی و مرگ می شود و مصرف آن به صورت شیرخوارگی، استنشاق، تزریق زیرپوستی و تزریق وریدی است؟
الف. دیازپام ب. مرفین ج. تریاک د. حشیش
۱۸. از کدام داروی زیر جهت درمان معتادان استفاده می شود؟
الف. متادون ب. اکسازپام ج. دیازپام د. باریتورات
۱۹. وضعیت "فراز" یعنی احساس شکفتن ذوق و هشیاری مفرط، حالت نشئه، وراجی، سرخوشی و خودبرتربینی مخصوص مصرف استنشاقی کدام ماده زیر است؟
الف. دکسدرین ب. بنزودرین ج. کوکائین د. متدرین
۲۰. تأثیر آمفتامین ها مشابه با تأثیر کدام ماده زیر است؟
الف. آدرنالین ب. گابا ج. استیل کولین د. دوپامین
۲۱. با مصرف کدام ماده زیر فرد دستخوش این احساس بدنی می شود که اندامهایش از تن جدا شده اند یا وجودش یکپارچگی خود را از دست داده است و شدیدترین تأثیر آن مجموعه نشانگان مرضی پارانوید است؟
الف. هروئین ب. ال.اس.دی ج. کوکائین د. بنزودرین
۲۲. نام دیگر فن سیکلیدین چیست؟
الف. اکس ب. ال.اس.دی ج. پی.سی.پی د. کانابیس

نام درس: روانشناسی اعتیاد - اعتیاد اجتماعی - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (سنتی ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: ۳۰ دقیقه
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۳۰
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

۲۳. مسمومیت حاد با کافئین متعاقب چه میزان از آن ایجاد می شود؟

الف. ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم

ب. ۵۰۰ میلی گرم

ج. ۲۵۰ میلی گرم

د. ۱۰-۵ گرم

۲۴. کدامیک از عوامل بیولوژیکی زیر باعث می شود که بعضی از افراد معتاد به الکل نشوند؟

الف. واکنش محیطی

ب. اضطراب شدید

ج. افزایش اندروژین

د. حساسیت جسمی مانند تهوع

۲۵. کدامیک از شخصیت های زیر از دیدگاه کُنبرگ (۱۹۷۳) از مواد مخدر برای برقراری احساسی مناسب به صورت احساس حقیقی بودن استفاده می کنند؟

الف. دپرسیو مازوخیستیک

ب. پارانوئید

ج. اسکیزوئید

د. خودشیفته

۲۶. بر اساس کدام نظریه اعتیاد گسترده در برخی مواقع جامعه ناشی از مشخصات سازمان اجتماعی است؟

الف. ستیز ارزشها

ب. ناهماهنگی در سازمان اجتماعی

ج. انحراف از هنجارها

د. نابرابری اجتماعی

۲۷. از دیدگاه کدامیک از افراد زیر، اعتیاد به مواد مخدر به علت تسکین درد، اختلالات شخصیتی و ناهنجاریهای روانی و عوامل فرهنگ فرعی ایجاد می شود؟

الف. کلمن

ب. چلین

ج. فریمان

د. چونز

۲۸. فلاکت در تمام امور زندگی، جسم و روان فرد معتاد در کدامیک از مراحل اعتیاد مشاهده می شود؟

الف. تشخیص آزمایشگاهی

ب. پیشرفت نسبی

ج. ابتدایی

د. پیشرفته

۲۹. از تزریق کدام ماده زیر برای تشخیص اعتیاد با استفاده از روشهای آزمایشگاهی استفاده می شود؟

الف. ان - آلیل نورمرفین (نالین)

ب. الکاوئید

ج. THC

د. P.C.P.

۳۰. کدامیک از موارد زیر از علل بازگشت به مواد مخدر محسوب نمی شود؟

الف. وجود معتادان دیگر یا دوستان سابق

ب. ضعف قوای جسمی فرد

ج. وجود مواد مخدر و سهولت دسترسی به آن

د. پر خوابی و تنبلی