

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی (ستی) (۱۲۱۷۰۲۹) - علوم تربیتی - مشاوره (تجمیع) (۱۲۱۱۰۹۸)

زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: آسیب شناسی روانی ۲ - دکتر جوانمرد

پیامبر اعظم (ص): روزه سپر آتش جهنم است.

۱. کدام گزینه زیر درباره نقش انتقال دهندهای عصبی در سبب شناسی افسردگی صحیح تر است؟
الف. سروتونین ب. دوپامین ج. استیل کولین د. تعامل سروتونین و نوراپی نفرین
۲. مهمترین ناحیه مغزی دخیل در افسردگی کدام است؟
الف. تالاموس ب. هیپوتالاموس ج. دستگاه لیمبیک د. دستگاه شبکه ای
۳. کدامیک از موارد زیر نیست روان تحلیل گری افسردگی است؟
الف. افسردگی یک مکانیسم دفاعی برگشت به مراحل اولیه رشد است.
ب. افسردگی یک مکانیسم دفاعی برگشت به مرحله دهانی است.
ج. افسردگی یک مکانیسم دفاعی برگشت به مرحله نهفتگی است.
د. افسردگی یک مکانیسم دفاعی برگشت به مرحله مقعدی است.
۴. بنا به نظریه فروید " از دست دادن فرضی یا نمادین نشانه چه بیماری است؟
الف. افسردگی ب. هیستری ج. اسکیزوفرنی د. هیستری
۵. اختلال افسرده خویی حالت خفیف تر و اختلال دو قطبی حالت شدیدتر است.
الف. اختلال افسردگی اساسی - افسرده خویی ب. اختلال ادواری خویی - افسردگی اساسی
ج. اختلال افسردگی اساسی - اختلال ادواری خویی د. اختلال دو قطبی - افسردگی اساسی
۶. کدام گزینه درباره رابطه جنسیت و افسردگی صحیح ست؟
الف. در شرایط نامناسبی که می تواند منجر به افسردگی شود مردان بیش از زنان توانایی برگشتن جواسفان از افکار منفی را دارند.
ب. زنان با احتمال بیشتری نسبت به مردان شکست های خود را به شرایط اجتماعی و فشارهای فرهنگی نسبت می دهند.
ج. مردان با احتمال بیشتری از زنان شکست هایشان را به ویژگیهای شخصی نسبت می دهند.
د. زنان با احتمال بیشتری از مردان در طی دوره غمگینی به مرحله دهانی برگشت می کنند.
۷. کدامیک از زیرمجموعه های اسکیزوفرنی با آشفتگی های بارز روانی - حرکتی مشخص می شود؟
الف. نوع آشفته ب. نوع پارانوئید ج. نوع کاتاتونیک د. نوع باقیمانده
۸. کدامیک از زیرمجموعه های اسکیزوفرنی با هذیان مشخص می شود؟
الف. نوع آشفته ب. نوع پارانوئید ج. نوع کاتاتونیک د. نوع باقیمانده
۹. کدامیک از زیرمجموعه های اسکیزوفرنی با نوع صحبت و رفتار آشفته و خلق بی حالت و نامتناسب مشخص می شود؟
الف. نوع آشفته ب. نوع پارانوئید ج. نوع کاتاتونیک د. نوع باقیمانده
۱۰. نام دیگر اسکیزوفرنی نوع آشفته چیست؟
الف. نوع هبفرنیا ب. نوع پارانوئید ج. نوع کاتاتونیک د. نوع باقیمانده

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (ست) (۱۲۱۷۰۲۹) - علوم تربیتی - مشاوره (تجمیع) (۱۲۱۱۰۹۸)

زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: آسیب شناسی روانی ۲ - دکتر جوانمرد

۱۱. کدام نشانه های زیر جزو نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب می شود؟
الف. رفتار و گفتار آشفته
ب. شنیدن صداهایی درباره تفکر فرد
ج. بی ارادگی و انزوای اجتماعی
د. باور به مشهور و ثروتمند بودن
۱۲. کدام دارو در درمان نشانه های منفی اسکیزوفرنی موفق تر عمل می کند؟
الف. هالوپریدول
ب. کلوزاپین
ج. کلرپرومازین
د. ایمی پرامین
۱۳. کدام روشها در درمان اسکیزوفرنی موفق ترند؟
الف. داروهای ضد روان پریش و ECT
ب. دارو درمانی و رفتاری شناختی
ج. دارو درمانی و درمان های روانی اجتماعی
د. دارو درمانی و روان تحلیل گری
۱۴. در کدام اختلال شخصیت الگوی پایداری از سوء ظن و عدم اعتماد به دیگران مشاهده می شود؟
الف. اسکیزوئید
ب. نمایشی
ج. اسکیزوتایپال
د. پارانویا
۱۵. کدام گزینه در مورد شخصیت ضد اجتماعی صحیح است؟
الف. شیوع این اختلال با افزایش سن پایین می آید.
ب. این اختلال در زنان بیش از مردان است.
ج. این اختلال هم ابتدایی با اضطراب دارد.
د. شدت این اختلال در طول زمان افزایش می یابد.
۱۶. کدام اختلال شخصیتی در زنان بیشتر است؟
الف. خودشیفته، نمایشی
ب. نمایشی، ضد اجتماعی
ج. خودشیفته، مرزی
د. نمایشی، مرزی
۱۷. شروع اختلالات شخصیت در چه زمانی می تواند باشد؟
الف. دوره بزرگسالی
ب. دوره میانسالی
ج. دوره نوجوانی یا کودکی اولیه
د. در تمام سنین
۱۸. علامت بارز کدام اختلال تنهایی مفرط، پرهیز از روابط اجتماعی و عدم ابراز مستقیم خشم است؟
الف. اسکیزوئید
ب. اسکیزوتایپال
ج. پارانویایی
د. مرزی
۱۹. کدامیک از اختلالات زیر را، اسکیزوفرنی شبه نروتیک یا اسکیزوفرنی سرپایی نیز می نامند؟
الف. شخصیت وابسته
ب. شخصیت دوری گزین
ج. ضد اجتماعی
د. شخصیت مرزی
۲۰. کدام دارو برای دوره های پرخاشجویی تکانشی در اختلال شخصیت ضد اجتماعی موثر است؟
الف. ضد اضطراب
ب. لیتیوم
ج. ضد افسردگی
د. هالوپریدول
۲۱. اصطلاح بی اشتهاهی روانی را چه کسی وارد قلمرو پزشکی کرد؟
الف. گول
ب. مورتن
ج. گانر
د. بیز
۲۲. کدام دارو در درمان بی اشتهاهی روانی محدود کننده مفید گزارش شده است؟
الف. ایمی پرامین
ب. ضد اضطراب
ج. ضد استفراغ
د. سیپروهپتادین

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی (ستتی) (۱۲۱۷۰۲۹) - علوم تربیتی - مشاوره (تجمیع) (۱۲۱۱۰۹۸)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —
زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است. منبع: آسیب شناسی روانی ۲ - دکتر جوانمرد

۲۳. درمان روان تحلیل گری برای مبتلایان به پراشتهایی روانی چیست؟
الف. کاهش احساس ویژه بودن بیمار، پرکردن خلأهایی که بیمار در خود می بیند
ب. ایجاد اتحاد درمانی برای کاهش مقاومت بیمار به درمان و درمان اختلال خود
ج. عینی سازی مکانیسم های دفاعی درون فکنی و برون فکنی، شبیه دویاره سازی
د. حل تعارضهای دهانی انحلال نیافته که موجب تثبیت در مرحله دهانی شده
۲۴. حملات غیر قابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل ۳ ماه به طول می انجامد از ملاکهای تشخیصی کدام نوع اختلال خواب است؟
الف. پر خوابی اولیه ب. بی خوابی اولیه ج. نارکولپسی د. اختلال خواب مرتبط با تنفس
۲۵. کدام گزینه در درمان دارویی نارکولپسی صحیح است؟
الف. ضد افسردگی ب. داروهای خواب آور ج. ضد اضطراب د. ویاگرا
۲۶. کدام اختلال طبقه بزرگی از اختلالات جنسی را بر می گیرد؟
الف. بدکارکردی های جنسی ب. پارافیلیاها ج. اختلال نعوظی د. بیزاری جنسی
۲۷. انزال زود رس مربوط به کدام نوع اختلال جنسی است؟
الف. اختلال اوج لذت جنسی ب. بدکارکردی جنسی ج. اختلال نعوظی د. بیزاری جنسی
۲۸. مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد سبب شناسی اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟
الف. روان تحلیلی ب. یادگیری ج. خانوادگی د. زیست شناختی
۲۹. عدم تشخیص و شناسایی اشیاء، علیرغم سالم بودن کارکرد حسی در آلزایمر چه نامیده می شود؟
الف. آپراکسی ب. آمنزی ج. آگنوزیا د. آفازی
۳۰. در کدام مرحله از آلزایمر در وجود بیماری جای شکی نمی ماند، اما بیمار می تواند استقلال خود را حفظ کند؟
الف. دمانس مبهم ب. دمانس متوسط ج. دمانس خفیف د. دمانس شدید
۳۱. کدامیک از موارد زیر درباره سبب شناسی عوامل ژنتیک در آلزایمر صحیح است؟
الف. بیش از ۵۰٪ از بستگان درجه اول فرد مبتلا به آلزایمر، به این اختلال دچار می شوند.
ب. بیش از ۸۰٪ از بستگان درجه اول فرد مبتلا به آلزایمر، به این اختلال دچار می شوند.
ج. ژن های موجود در در کروموزوم ۱۹ و ۲۱ در این بیماری دخالت دارند.
د. ژن های موجود در در کروموزوم های جفت ۱۴ در این بیماری دخالت دارند.
۳۲. کدام مداخله دارویی برای مقابله با عوارض بیماری آلزایمر صحیح است؟
الف. افزایش سطح دوپامین ب. کاهش سطح دوپامین
ج. کاهش سطح استیل کولین د. افزایش سطح استیل کولین

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: —

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (ست) (۱۲۱۷۰۲۹) - علوم تربیتی - مشاوره (تجمیع) (۱۲۱۱۰۹۸)

زمان آزمون: تستی: ۵۵ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

منبع: آسیب شناسی روانی ۲ - دکتر جوانمرد

۳۳. کدامیک از گزینه های زیر درباره صدمات بسته ی سر (ضربات مغزی بسته) صحیح است؟
الف. از تغییر و تکان کل مغز در درون جمجمه بوجود می آید و موجب آسیب پراکنده می شود.
ب. معمولاً موجب ضایعاتی به جمجمه یا بافت مغزی می شود و آسیب خاص بوجود می آورد.
ج. کلیه موارد ناشی از صدمات بسته ی سر ناشی از سوانح رانندگی است.
د. کلیه موارد ناشی از صدمات بسته ی سر ناشی افتادن از بلندی است.
۳۴. کدام ویژگی زیر در افراد صدمات مغزی بیشتر از افراد عادی است؟
الف. افسردگی و اضطراب
ب. افسردگی و خودکشی
ج. اضطراب و عزت نفس پایین
د. اضطراب و خودکشی
۳۵. اختلالات عاطفی فصلی به وسیله کدام یک از متخصصین زیر مطرح شد؟
الف. آدامز
ب. روزنتال
ج. بتل هایم
د. ون اس
۳۶. پدر صرع جدید کیست؟
الف. پارکینسون
ب. آدامز
ج. جکسون
د. گلدشتاین
۳۷. عوامل خطر برای بروز زوال عقلی در بیماران پارکینسونی شامل چه مواردی است؟
الف. ضایعات مغزی
ب. شدت بیماری
ج. مدت بیماری
د. مدت زمان بیماری و سن
۳۸. مهمترین عوارض جانبی مصرف دارو در بیماران پارکینسونی چیست؟
الف. مشکلات روانشناختی و جسمانی
ب. مشکلات جسمی و افسردگی
ج. مشکلات اضطرابی و خواب
د. مشکلات شناختی و جسمانی
۳۹. در مدل بهبود کارکردهای اجرایی برانسفورد و استاین (IDEAL) حرف D به چه معناست؟
الف. تعریف مسئله
ب. مواجهه با مسئله
ج. واریسی اثرمندی طرح انتخابی
د. تشخیص مسئله
۴۰. مرگ و میر ناشی از مشکلات مربوط به MS ناشی از کدام موارد است؟
الف. خودکشی
ب. خفگی و مشکلات کلیوی
ج. التهاب ریوی
د. همه موارد