

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

درس: فیزیک جدید ۱

رشته تحصیلی/کد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۰۸

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- شناگری می تواند با سرعت C در آب ساکن شنا کند. این شناگر در رودخانه ای که سرعت جریان آب u است مسافت L را در جهت عرض رودخانه طی کرده و به نقطه اول برمی گردد. زمان رفت و برگشت برابر است با:

$$۲. \frac{\frac{2L}{C}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{C^2}}}$$

$$۱. \frac{\frac{L}{C}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{C^2}}}$$

$$۴. \frac{2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{C^2}}}$$

$$۳. \frac{\frac{L}{C}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{C^2}}}$$

۲- کدام یک از کمیت های زیر تحت تبدیل گالیلئو ناورد است؟

۱. بازه فضایی ۲. مکان ۳. بازه زمانی ۴. جرم

۳- کدام گزینه، از آزمایش مایکلسون - موری نتیجه گرفته می شود؟

۱. چارچوب مرجع مطلق وجود ندارد و کلیه چارچوب ها نسبی هستند.
۲. مکانیک نیوتنی در کلیه سرعت ها درست است.
۳. یک چارچوب مرجع مطلق وجود دارد.
۴. سرعت نور در همه موارد نسبی است.

۴- سرعت یک مزون $C0/998$ و از زمان تولد تا نابودی مسافت $m 600$ را از نظر خود مزون طی می کند. مسافت طی شده از نظر ناظر زمینی چه اندازه است؟

۱. $m 9500$ ۲. $600 m$ ۳. $m 9000$ ۴. $m 1900$

۵- تغییر طول موج را در اثر نسبیتی برای خط H_{α} (6563 \AA) گسیل شده از ستاره ای که با سرعت $0.1C$ از زمین دور می شود برابر است با:

۱. 7256 \AA ۲. 7200 \AA ۳. 7000 \AA ۴. 7600 \AA

۶- سرعت یک الکترون وقتی تکانه ی آن ۱۰ برابر جرم سکون تقسیم بر سرعت نور است برابر می شود با:

۱. $C0/95$ ۲. $C0/59$ ۳. $C0/995$ ۴. $C0/899$

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: فیزیک جدید ۱

رشته تحصیلی/کد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۰۸

۷- قانون جابجایی وین عبارت است از اینکه با افزایش دمای جسم سیاه

۱. مقدار انرژی تابشی کاهش می یابد و بیشینه و یا قله گسیلندگی به بسامدهای بالاتر تغییر مکان می دهد.
۲. مقدار انرژی تابشی کاهش می یابد و بیشینه و یا قله گسیلندگی به بسامدهای پایین تر تغییر مکان می دهد.
۳. مقدار انرژی تابشی افزایش می یابد و بیشینه و یا قله گسیلندگی به بسامدهای پایین تر تغییر مکان می دهد.
۴. مقدار انرژی تابشی افزایش می یابد و بیشینه و یا قله گسیلندگی به بسامدهای بالاتر تغییر مکان می دهد.

۸- سطح فلز سدیم را با پرتویی به انرژی 4.1 eV می تابانیم. تابع کار فلز سدیم برابر 2.46 eV است. انرژی جنبشی الکترون های رها شده از سطح برابر است با:

۱. $1/8 \text{ eV}$
۲. $1/68 \text{ eV}$
۳. $1/6 \text{ eV}$
۴. $1/98 \text{ eV}$

۹- برای پرتوهای X به طول موج 0.24 nm پراکندگی کامپتون صورت می گیرد و باریکه پراکنده در زاویه 60° نسبت به باریکه

فرودی مشاهده می شود. طول موج پرتوهای پراکنده برابر است با: $(\lambda_c = 0.0243 \text{ \AA})$

۱. 0.2412 nm
۲. 0.3612 nm
۳. 0.3412 nm
۴. 0.2612 nm

۱۰- کدام گزینه خصوصیات تولید زوج را ارائه نمی دهد؟

۱. وقتی تولید زوج در مجاورت یک هسته اتمی تولید شود برخی از اصول پایستگی نقض می شود.
۲. تولید زوج تبدیل انرژی تابشی به انرژی جرم سکون و انرژی جنبشی است.
۳. فوتونی با انرژی زیاد تمامی انرژی $h\nu$ ی خود را در برخورد با هسته از دست داده و یک الکترون و یک پوزیترون می آفریند و به آنها انرژی جنبشی می دهد.
۴. وقتی تولید زوج در مجاورت یک هسته اتمی تولید شود هیچ یک از اصول پایستگی نقض نمی شود.

۱۱- به یک بلور باریکه ای از پرتوهای X به طول موج 0.25 nm می تابد. نخستین بازتاب براگ در زاویه 30° مشاهده می شود. فاصله بین اتمهای آن چقدر است؟

۱. 0.25 nm
۲. 0.1 nm
۳. 0.5 nm
۴. 0.53 nm

۱۲- طول موج دوبروی یک الکترون با سرعت $1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ را حساب کنید.

فرض: $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ و $h = 6.63 \times 10^{-34}$

۱. $7.3 \times 10^{-3} \text{ m}$
۲. $7.3 \times 10^{-15} \text{ m}$
۳. $7.3 \times 10^{-3} \text{ m}$
۴. $7.3 \times 10^{-11} \text{ m}$

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: فیزیک جدید ۱

رشته تحصیلی/کد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۰۸

۱۳- کدام گزینه در خصوص سرعت گروه و سرعت فاز موج درست است؟

$$v_p = \frac{\omega}{k}, v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad .2$$

$$v_g = \frac{\omega}{k}, v_p = \frac{d\omega}{dk} \quad .1$$

$$v_g = \frac{k}{\omega}, v_p = \frac{dk}{d\omega} \quad .4$$

$$v_p = \frac{k}{\omega}, v_g = \frac{dk}{d\omega} \quad .3$$

۱۴- سرعت فاز امواج دوبروی وابسته به یک ذره متحرک به جرم m و سرعت v برابر است با:

$$v_p = \frac{v}{c^2} \quad .4$$

$$v_p = \frac{c^2}{v} \quad .3$$

$$v_p = \frac{c^2}{v^2} \quad .2$$

$$v_p = \frac{v^2}{c^2} \quad .1$$

۱۵- بر اساس اصل عدم قطعیت آیا الکترون در هسته اتم وجود دارد؟ (شعاع هسته اتم حدود $5 \times 10^{-15} \text{ m}$)

بله .۲

خیر .۱

ممکن است وجود داشته باشد. .۴

هنوز اثبات نشده است. .۳

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} \quad \text{کدام}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

اگر ذره ای که در خط مستقیم حرکت می کند دارای انرژی باشد با فرض اینکه داریم $\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$ کدام گزینه درست است؟

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{12h}{\pi} \quad .4$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{4h}{\pi} \quad .3$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{\pi} \quad .2$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi} \quad .1$$

۱۶- کدام گزینه فرض مناسب در باره خواص معادله موج مکانیک کوانتومی نیست؟

۱. معادله باید با معادله $E = \frac{p^2}{2m} + V$ که انرژی کل E ذره به جرم m را به انرژی جنبشی $\frac{p^2}{2m}$ و انرژی پتانسیل آن V مربوط می کند سازگار باشد.

۲. معادله باید نسبت به $\psi(x, t)$ خطی باشد. شرط خطی بودن تضمین کننده این امر است که ما می توانیم تابع های موج را با یک دیگر جمع کنیم تا تداخلهای سازنده و ویرانگر که مشخصه امواجند ایجاد شود.

۳. معادله را می توان از اصول اساسی فیزیک بدست آورد.

۴. معادله باید با اصول موضوع دوبروی - انیشتین، $\lambda = \frac{h}{p}, v = \frac{E}{h}$ سازگار باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

درس: فیزیک جدید

رشته تحصیلی/کد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۰۸

۱۸- یک ذره روی محور x محدود شده است و تابع موج آن بین $x=0$ و $x=1$ برابر $\psi = ax$ است در بقیه جاها $\psi = 0$ می باشد. مقدار چشم داشتی $\langle x \rangle$ مکان ذره را پیدا کنید.

$$\langle x \rangle = \frac{a^4}{4} \quad \langle x \rangle = \frac{a^2}{4} \quad \langle x \rangle = \frac{a^4}{2} \quad \langle x \rangle = \frac{a^4}{3}$$

۱۹- کدام گزینه از ویژگی های تابع موج ψ نمی باشد؟

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z} \quad \frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z} \quad \psi \quad \psi$$

۲۰- ذره ای واقع در جعبه دو بعدی در تراز انرژی $13E_0$ واکن است. کدام گزینه مربوط به این تراز است؟

$$n_y = 2, n_x = 1; n_y = 1, n_x = 2 \quad n_y = 9, n_x = 3; n_y = 3, n_x = 9 \quad n_y = 1, n_x = 3; n_y = 3, n_x = 1 \quad n_y = 2, n_x = 3; n_y = 3, n_x = 2$$

۲۱- کدام گزینه در خصوص انرژی نوسانگر از نظر مکانیک کوانتوم درست نیست؟

۱. انرژی مجاز نوسانگر هماهنگ یک طیف پیوسته است.
۲. انرژی های مجاز نوسانگر هماهنگ یک طیف پیوسته تشکیل نمی دهند بلکه ویژه مقدارها هستند.
۳. پایین ترین تراز انرژی مجازی در $E=0$ نیست بلکه کمینه معینی $E=E_0$ دارد.
۴. احتمال نفوذ ذره در چاه پتانسیل و نفوذ در فراتر از $-A$ و $+A$ وجود دارد.

۲۲- طبق نظریه کلاسیک، اتم رادرفورد:

۱. موقتاً پایدار است.
۲. پایدار است.
۳. شبه پایدار است.
۴. ناپایدار است.

۲۳- آزمایش نشان میدهد که انرژی برابر با 13.6eV برای جدا کردن الکترون از اتم هیدروژن لازم است. شعاع مداری الکترون

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}, \epsilon_0 = 8.85 \times \frac{10^{-12} \text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

$$r = 5.3 \times 10^{-10} \text{m} \quad r = 5.3 \times 10^{-9} \text{m} \quad r = 5.3 \times 10^{-11} \text{m} \quad r = 5.3 \times 10^{-15} \text{m}$$

سری سوال : ۱ یک

درس : فیزیک جدید

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد) ۱۱۱۳۰۰۸

۲۴- طول موج دومین خط سری پاشن را برای اتم هیدروژن حساب کنید.

$$\lambda = 19.82 \text{Å} \quad .\text{f} \quad \lambda = 15.82 \text{Å} \quad .\text{v} \quad \lambda = 22.82 \text{Å} \quad .\text{r} \quad \lambda = 12.82 \text{Å} \quad .\text{a}$$

۲۵- در اتم هیدروژن وقتی الکترونی از حالت n به حالت $n-1$ می رود بسامد تابش گسیل شده متناسب است با:

$$n^{-4} \quad .\gamma \qquad n^{-1} \quad .\gamma \qquad n^{-3} \quad .\gamma \qquad n^{-2} \quad .1$$

۲۶- آزمایش فرایند - هرگز بیانگر چه موضوعی است؟

۱. اسپین الکترولیز

۳. وجود ترازهای انرژی در اتم

۲۷- الکترونی در یک اتم چند الکترونی دارای مقدار بیشینه $m_l = 4$ است. کدام گزینه در رابطه با n درست است؟

$$n \geq 3 \quad n \geq 4 \quad n \geq 5 \quad n \geq 1$$

۲۸- محتمل ترین فاصله یک الکترون تا مبدأ به ازای $p(r) = r^2 |R|^2 = r^2 \frac{1}{24\pi\alpha_0^3} e^{-\frac{r}{\alpha_0}}$ برابر است با:

$$a_0 \cdot 4 \quad 3a_0 \cdot 3 \quad 2a_0 \cdot 2 \quad 4a_0 \cdot 1$$

۲۹- گشتاور مغناطیسی الکترونی که در مدار دایره ای به شعاع r دور پروتون می چرخد برابر است با:

$$\mu = \frac{e^2}{r} \sqrt{\frac{k}{m^2}} \quad \mu = \frac{e^2}{2} \sqrt{\frac{kr}{m}} \quad \mu = \frac{e^2}{r} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \mu = \frac{e^2}{r} \sqrt{\frac{k}{2m}}$$

۳۰- بزرگی اندازه حرکت زاویه ای مداری در حالت $l = 3$ برابر است با:

$$\sqrt{12\hbar} \cdot f \qquad \sqrt{3\hbar} \cdot r \qquad \sqrt{24\hbar} \cdot y \qquad \sqrt{2\hbar} \cdot i$$