

نام درس: شیمی عمومی

رشته تحصیلی-گرایش: فیزیک - اقتصاد کشاورزی

کد درس: ۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۰۰۲

تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی -- تشریفی ۶

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لفته تشریفی ۶۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۴

استفاده از ماشین حساب مجاز است:

۱- کدامیک دلیل مشاهده درخشش در یک حباب شیشه‌ای که از هوا تخلیه شده است (فشار کمتر از 10^{-4} اتمسفر) می‌باشد، وقتی که بین دو الکترود داخل حباب اختلاف پتانسیل بزرگی برقرار شود؟

(ب) تولید پرتو کاتدی

(د) تولید پرتو مثبت

(الف) ساطع شدن پرتو آلفا

(ج) بمباران به وسیله پرتو گاما

۲- کدامیک دلیل انحراف ذرات α در آزمایش رادرفورد است؟

(ب) وجود فضای خالی در هسته

(الف) وجود ذرات بدون بار در هسته

(د) وجود الکترون در حجم کل اتم

(ج) تمرکز بار مثبت اتم در هسته

۳- کدامیک از تابش‌های الکترومغناطیسی، بلندترین طول موج را دارد؟

(د) پرتو γ

(ب) پرتو زیرقرمز

(ج) پرتو X

۴- هنگامی که عدد کواترومی ۱۱ برای یک الکترون بی نهایت شود در انرژی آن چه تاثیری دارد؟

(ب) انرژی کمتر می‌شود.

(د) انرژی تغییری نمی‌کند.

(الف) انرژی بیشتر می‌شود.

(ج) انرژی به صفر می‌رسد.

۵- ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت برای یک مول گاز تک اتمی چقدر است؟

(د) $2R$ (ج) $\frac{5}{2}R$ (ب) $\frac{1}{2}R$ (الف) $\frac{3}{2}R$

۶- کدامیک آرایش الکترونی عنصر با عدد اتمی ۲۴ است؟

(د) $[Ar]3d^54s^1$ (ج) $[Ar]3d^64s^2$ (ب) $[Ar]3d^4$ (الف) $[Ar]3d^44s^2$


۷- کدامیک الکترونگاتیوی را درست تعریف می‌کند؟

(الف) انرژی لازم برای کندن یک الکترون از یک اتم گازی است.

(ب) میزان توانایی یک اتم برای جذب الکترون در یک مولکول است.

(ج) انرژی فرایندی است که در آن یک اتم به یون منفی تبدیل می‌شود.

(د) نیروی دافعه الکترواستاتیکی بین الکترون و یون منفی است.

۸- کدامیک انرژی آزاد شده در واکنش زیر در فشار ثابت است؟ اگر انرژی پیوند $(C-H)=98 \text{ kcal/mol}$ و $(C-Cl)=80 \text{ kcal/mol}$ باشند.

(د) -۱۸

(ج) -۳۳۸

(ب) -۳۷۴

(الف) +۱۷۸

تعداد سوال: نسخه ۲۶ نکملی -- تشریعی ۶
 زمان امتحان: تستی و نکملی ۶۰ لفته تشریعی ۶۰ لفته
 تعداد کل صفحات: ۴

نام درسن: شیمی عمومی
 رشته تحصیلی-گرایش: فیزیک - اقتصاد کشاورزی
 کد درسن: ۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲

۹- مخلوطی از ۳۲ گرم گاز اکسیژن و ۴۰ گرم گاز هلیم دارای فشار کل $۲۲atm$ / ۰ است. فشار جزئی اکسیژن در این مخلوط چقدر است؟ $(^{۱۴}He, ^{۱۶}O)$

الف. $۰/۲atm$ ب. $۰/۰۲atm$ ج. $۰/۰atm$ د. $۰/۲۲atm$

۱۰- کدامیک از قاعده هشت تایی پیروی نمی کند؟ $(^{۱۶}O, ^{۱۴}N, ^{۱۲}C, ^{۱}H)$

الف. NO ب. N_2 ج. CO_2 د. NH_4^+

۱۱- از مجموع توابع موجی دو اوربیتال $2P$ در همپوشانی جانبی آنها کدام اوربیتال مولکولی ایجاد می شود؟
 الف. π^* ب. σ^* ج. σ د. σ^*

۱۲- در مولکول Be_2 مرتبه پیوند کدام است؟ (^{۹}Be)

الف) صفر ب) ۱ ج) ۲ د) ۴

۱۳- در مولکول های دو اتمی فلزات قلیایی انتظار می رود بیشترین انرژی پیوند مربوط به کدامیک باشد؟
 $(^{۵۵}Cs, ^{۱۹}K, ^{۱۱}Na, ^{۳}Li)$

الف) Na_2 ب) K_2 ج) Li_2 د) Cs_2

۱۴- کدامیک هیبرید شدن اربیتال های اتم کربن برای تشکیل مولکول استیلن را نشان می دهد؟ (^{۱۴}C)

الف) P^3 ب) sp^2 ج) sp^3 د) sp

۱۵- ساختار هندسی مولکول SF_6 کدام است؟ $(^{۳۲}S, ^{۱۹}F)$

الف) چهاروجهی ب) شش وجهی ج) هشت وجهی د) دوهرمی مثلثی

۱۶- اندازه گیری ممان دوقطبی مقیاس خوبی برای تعیین کدامیک است؟

الف) ساختار مولکولی ترکیب ب) طول پیوند کووالانسی

ج) اندازه زاویه پیوندی د) قطبیت پیوند

۱۷- نیروهای جاذبه بین مولکول های SO_2 از کدام نوع است؟ $(^{۳۲}S, ^{۱۶}O)$

الف) نیروهای کولنی ب) دوقطبی-دوقطبی ج) نیروهای واندروالسی د) پیوندهای کووالانسی

۱۸- یک نمونه گازی در دمای صفر درجه سانتیگراد و فشار ۲ اتمسفر ۱۰ لیتر حجم دارد. اگر این گاز متراکم شود و حجم آن به ۵ لیتر برسد بدون آن که دمای آن تغییر کند. فشار نهایی چقدر می شود؟

الف) $۲۲/۴ atm$ ب) $۱۶/۷ atm$ ج) $۴ atm$

۱۹- براساس قانون نفوذ مولکولی گراهام گاز سرعت نفوذ بیشتری دارد؟

الف. N_2 ب. O_2 ج. SO_2 د. CO_2

۲۰- مقاومت یک مایع در مقابل جاری شدن را چه نامند؟

الف) کشش سطحی ب) اسمز ج) نفوذ مولکولی د) گرانزوی

تعداد سوالات: نسخی ۲۶ تکمیلی — تشریحی ۶
زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لپتاً تشریحی ۶۰ لپتاً
تعداد کل صفحات: ۴

نام درس: شیمی عمومی

رشتہ تفصیلی - گرایش: فیزیک - اقتصاد کشاورزی

کد درس: ۱۱۱۴۰۹۲ - ۱۱۱۴۰۰۲

۲۱- کدامیک در مورد فشاربخار جامدات صحیح است؟

- الف) جامدات اصلاً فشاربخار ندارند.
- ب) فشاربخار جامدات با نیروی جاذبه بین مولکولی شان نسبت عکس دارد.
- ج) بر اثر گرم کردن فشاربخار جامدات تغییری نمی کند.
- د) فشاربخار بلورهای یونی بسیار بالاست.

۲۲- اگر در بلوری با فرمول کلی MX کاتیون در مرکز هشت وجهی منظمی که رئوس آن را آنیون ها تشکیل داده اند قرار گرفته باشد، عدد کوئردیناسیون کاتیون آن کدام است؟

٤) الف (ب) ج (ج) د (د)

۲۳- کدامیک در مورد تغییر انحلال پذیری مقدار کمی از یک ماده حل شونده در حلالی که با جذب گرما محلول اشبع شده ای بوجود می آورد، صحیح است؟

الف) انحلال پذیری چنین ماده ای با افزایش دما، افزایش می یابد.

ب) انحلال پذیری چنین ماده ای یا کاهش دما افزایش می یابد.

ج) انحلال پذیری چنین ماده ای یا افزایش دما کاهش می یابد.

د) تغییر دما در انحلال پذیری چنین ماده ای بی اثر است.

۲۴- برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۲ مولار اسید نیتریک، چند گرم اسید نیتریک ۶۳٪ باید به کار برد؟ (جرم مولکولی اسید نیتریک ۶۳ است).

الف) ١٠ بـ ٣/٩٧ جـ ٧/٩ دـ ٢٠

۲۵- تهیه کدامیک از محلولهای زیر گرمaza می باشد؟

الف) آنهایی که انحراف مثبت از قانون دالتون دارند.

ب) آنهایی که انحراف منفی از قانون دالتون دارند.

ج) آنهایی که انحراف مثبت از قانون رائول دارند.

د) آنهایی که انحراف منفی از قانون رأیول دارند.

۲- کدامیک رابطه انرژی آزاد با ثابت تعادل یک واک

۲۶- کامیک رابطه انرژی آزاد با ثابت تعادل یک واکنش گازی در حال تعادل را نشان می دهد؟

$$\Delta G = nRT \ln k \quad (د) \quad dG = VdP - SdT \quad (ج) \quad \Delta G = -RT \ln k_p \quad (ب) \quad \Delta G = -mk_p \quad (الف)$$

تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی -- تشریحی ۶
 زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لفته تشریحی ۶۰ لفته
 تعداد کل صفحات: ۴

نام درس: شیمی عمومی
 رشته تحصیلی-گرایش: فیزیک - اقتصاد کشاورزی
 کد درس: ۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۰۰۲

سؤالات تشریحی:

- ۱- از مطالعه پدیده فتوالکتریک چه نتایجی حاصل شد؟
 - ۲- آرایش اوربیتالهای مولکولی و خاصیت مغناطیسی CO را بنویسید؟
 - ۳- اجزای سازنده، نیروهای جاذبه و قابلیت هدایت الکتریسیته را در انواع بلورهای یونی، شبکه‌ای و فلزی مقایسه کنید.
 - ۴- تعداد مول‌های یک گاز ایده آل را در دمای $C = 77^\circ$ و فشار $P = 0.41$ و حجم $V = 700$ میلی لیتر محاسبه کنید.
 - ۵- انرژی فعال‌سازی واکنشی در $\Delta H^\circ = 25^\circ C$ ، $\Delta S^\circ = 50 \text{ J/mol K}$ می‌باشد. بر اثر افزودن یک کاتالیزور مناسب، سرعت واکنش $\Delta E^\circ = 15$ برابر افزایش یافته است. انرژی فعال‌سازی این واکنش را در حضور کاتالیزور تعیین کنید.
 - ۶- اگر آنتالپی تشکیل ΔH°_f (s) CO_2 , CO , Fe_2O_3 به ترتیب -196 و -94 و -26 کیلوکالری بر مول باشند. تغییر آنتالپی را برای واکنش زیر به دست آورید:
- $$\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 3\text{CO}(g) \longrightarrow 2\text{Fe}(s) + 3\text{CO}_2(g)$$

اطلاعات:



$$R = ۰/۰۸۲ \frac{\text{lit.atm}}{\text{mole.deg}}, R = ۸/۳۱۴ \frac{\text{J}}{\text{mole.deg}}$$